

Наблюдательная программа при ХЗВ

Современная терапия хронических заболеваний вен нижних конечностей: в фокусе — трансдермальные флеботропные препараты

ЦЕЛЬ:

оценить эффективность и безопасность применения препарата Детрагель

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

- ✓ 1734 пациентов с ХЗВ, класс CEAP, C0 – C6, у пациента от 3 до 5 веноспецифических симптомов
- ✓ Терапия: Детрагель монотерапия (58% случаев, 1005 пациентов), либо в комбинации с Детралекс 1000 мг
- ✓ Период наблюдения 14 дней
- ✓ Частота нанесения Детрагель в зависимости от предпочтений врача, от 1 до 5 раз ежедневно
- ✓ Оценка динамики симптомов по шкалам (баллы)

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Отличия пациентов группы монотерапии Детрагель Vs Детрагель+Детралекс:



- ✓ Значительно больше пациентов моложе 40 лет
- ✓ Меньше пациентов старше 65 лет с более тяжелыми формами ХЗВ

2. Пациенты, получавшие Детрагель, отмечали существенное уменьшение выраженности веноспецифических симптомов.

3. Оценили лечение как «хорошо» и «отлично» 87% пациентов и 90% врачей соответственно.

Незначительные кожные реакции отметили 2 (0,12%) пациента.

4. Снижение выраженности симптомов в 2 и более раз пациентов на монотерапии Детрагель позволяет говорить об отсутствии эффекта плацебо.



Выводы:

Детрагель (в монотерапии и комбинации с Детралекс) значительно уменьшает симптомы у пациентов с симптомами ХЗВ